



UPORABA ŠUMA.

◦ PO ČAYER-MAYRU ◦

◦ IZDVOJ. KLUB HRV. ŠUM. AKADEMIČARA ◦

◦ U ZAGREBU 1912 ◦

Literatura: Die Forstberatung von dr. K. Gayer und dr. H. Mayr, 10. Auflage, Berlin.

I. Poglavlje.

Anatomskaa svojstva, struktura, lektura i raspoznavanje dva. ~

Da se mogu označiti pojedine časti tkanja drvenog tijela i rastumačiti njegov postanak, neophodno je nužno poznavati bar temeljna mikroskopska načela s anatom. kojih izgradnji dva. —

Stanice srčevine ili jexgre, svi dva sastoje ponajviše od izodiametričkih ćelijica, koje na istom nastajućem izbojku živahnim dijeljenjem prouzrokuju prirast izbojka u visinu. Pri tome one stanice, koje jexgru izvana obužuju, pogoduju ovome produljivanju djelomice dijeljenjem, a djelomice pružanjem u duljinu. Stanice srčevine gube često veći za rana svoju sadržinu, a preostaje još samo zrak. Često pridruži ipak i na dulje vremena plazmatičku sadržinu, te onda služe za nakupljanje škroba i tomu sličnih spojeva. Dok je su djelovanje jexgre kod prirasta jednogodišnjeg izbojka znatno, to ona postaje kasnije ne gledeći na njenu diagnostičnu važnost po samu kakvoću dva bez ikakve važnosti.

Literatura: Die Forstberatung von dr. K. Gayer und dr. H. Mayr, 10. Auflage, Berlin.

1. Poglavlje.

~ Anatomskha svojstva, struktura, textura i raspoznavanje drva. ~

Da se mogu označiti pojedine časti tkanja drvenog tijela i rastumačiti njegov postanak, neophodno je nužno poznavati bar temeljna mikroskopska načela s anatomskoj izgradnji drva. —

Stanice srčevine ili jexgec, svki drvo sastoje ponajviše od ixodiametričkih ćelijica, koje na istom nastajućem izbojku živahnim dijeljenjem prouzrokuju pirast izbojka u visini. Pri tome one stanice, koje jexgri izvana obuzuju, pogoduju ovome produljivanju djelomice dijeljenjem, a djelomice povećanjem u duljinu. Stanice srčevine gube često veći za rana svoju sadržinu, a preostaje još sumno zrak. Često poviđe ipak i na dulje vremena plazmatičku sadržinu, te onda služe za nakupljanje škroba i tomu sličnih spojeva. Dok je su djelovanje jexgre kod pirasta jednogodišnjeg izbojka znatno, to ona postaje kasnije ne gledeći na njenu diagnostičnu važnost po samu kakovinu drva bez ikakve važnosti.

Chinin je gorki alkaloid jaks bazičnih svojstava tako, da u trigovini dolazi kao fosfor, no kiseli i sumporno kiseli chinin. Nalazi se u kori linchona drva, koje u koplijim sub-tropskim krajevima uzgajaju kao srednje šume slično kao kod nas brastove šume gr. ljače. —

M Zagrebu, mjeseca srpnja 1912. —

Prema Gayer-Mayrovoj
uporabi sastavio:
Božidar Neuhold,
kand. Šum.

Prepisao:

Pero Kovacević
kand. Šumarstva