

PREDAVANJA na kr. šumarskoj akademiji ZAGREBAČKOJ

---

HEINZ

Šumska botanika

Predavanja na R. Šumarskoj akademiji  
zagrebačkoj.



Šumarska  
botanika

Pre predavanja sveuč. prof. L<sup>ca</sup> A. Heimera

god: 1907.

Izdati:

"Klub hrvatskih šumarskih akademičara"

Coniferae - Taxaceae.



Taxus baccata L. (Tisa)

U primarna predjelo i južno Evrope, severno do Norveške, te od Arvica južno Belgije, Male Orijije etc. do Himalaja. U nas jest i formidano (Dobra, Gorani, Hotan, Zagrebačka gora etc. Cesto samo grmolisto parvita; drveća najviša do 15 m visoka i do 1 m u prečeru. Plodovi do 100 g. Habitus drveća široko-piramidalan, stabla pravo-erecta, kruno pa rivo-erectum flo. iactum filom. Ullate grane padavim i elaei od potpuna pilarnih hotanskih bara. Cetine i - 3 1/2 cm duge, 2 mm široke, ozgo panno, ordo uzello pelere, spiralis foreotano ali kao u jle, uadnactno dvojedno-čeljusto fastuagene. Sitni čuivadi pupovi parovi i podjelajini javuhicama. Cijetovi prvobno dvostronni. ♂ matave (ca 6 mm, glavicašte penec i; ♀ cejetovi terminalni na vrlo kratkim gubkaditum u paruhicama vegetativnog lišća stajeci u rotacionia; ♀ cv. produclan na sjemeni kramet (sufarom), od Ruzega se parvije ja poliska sordom sjemenikom luginom odjenu ta sjemenka, koja je u većem dijelu sorne odjenu ta rivo-erectum mednativu arelom.

Orlovi monti, hysava fovejasa, norki druge  
nz. *L. sylvestrum*, *alpicum*, *iniqua* etc  
Mallui Gomori.

Rar. Campanulatae

Fam. Ruscitaceae,

- Campanulatae i, Compositae  
ystron perquisito relati.

U Zagrebu 15. II. 1907.

M. Senarath  
Aud. for