

ROBERTO DEL FAVERO

**SUL RENDIMENTO DI LAVORAZIONE
DELLE TRAVI "USO TRIESTE"**

**ATTI DELL'ISTITUTO DI ECOLOGIA E SELVICOLTURA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PADOVA**

VOLUME IV
1982-1983
PUBBLICAZIONE N. 1

PADOVA, 1984

RIASSUNTO

Le tavole del peso fresco dei polloni di leccio, roverella, castagno, cerro e ontano napoletano si basano su osservazioni eseguite su 528 piante abbattute.

Le tavole sono vevolevoli non solo per i boschi del bacino del Bussento (Salerno), ma anche per popolamenti di altre zone, in cui, però, è stata accertata similarità di valore nel rapporto diametro-altezza dendrometrica.

SUMMARY

*DOUBLE-ENTRY TABLE FOR THE WET WEIGHT OF THE SHOOTS OF HOLM OAK,
PUBESCENT OAK, EUROPEAN CHESTNUT, TURKEY OAK ITALIAN ALDER
IN THE BUSSENTO WATERSHED (SA)*

Wet weight tables for the shoots of holm oak, pubescent oak, European chestnut, Turkey oak and Italian alder are given based on observations of 528 felled plants.

Tables are reliable not only for the forests of the Bussento (Salerno) watershed, where, however, a similar value in the diameter-dendrometric height ratio has been found.